



Descubra un tratamiento para la agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

DESCUBRA MÁS >



INDICACIÓN:

REXULTI es un medicamento recetado que se usa para tratar la agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

REXULTI no debe usarse como tratamiento “según sea necesario” para la agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DESTACADA:

Mayor riesgo de muerte en personas mayores con psicosis relacionada con demencia. Los medicamentos como REXULTI pueden aumentar el riesgo de muerte en personas mayores que han perdido el contacto con la realidad (psicosis) debido a la confusión o a la pérdida de memoria (demencia). REXULTI no está aprobado para el tratamiento de personas con psicosis relacionada con demencia sin agitación que podría ocurrir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

Lea la [INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD](#) en las páginas 14-15.



Interpretación de actores

¿Qué es la agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer?

Aunque podría sonar parecido a la demencia por enfermedad de Alzheimer, son dos diagnósticos distintos que se tratan por separado. **La agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer** puede hacer que su ser querido se comporte de maneras que quizás nunca lo vio comportarse antes. Los síntomas se pueden dividir en 3 categorías: Desasosiego, Agresividad verbal y Agresividad física: cada una con sus conductas y desafíos característicos posiblemente familiares para usted.

No está solo en el cuidado de su ser querido.

Varios estudios demuestran que de los 6.9 millones de personas mayores de 65 años en Estados Unidos con demencia por Alzheimer, la mitad o más desarrollan **agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer**.

Haga el seguimiento de los síntomas de agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

Ya sea que su ser querido presente pocos o muchos síntomas, es importante que usted le diga al médico lo que ha notado.



Desasosiego

- Caminar de un lado a otro o mecerse repetidamente
- Sobresaltos frecuentes
- Comportamiento social inapropiado o señala a las personas con el dedo
- Irritabilidad
- Temblores
- Conductas peculiares repetitivas
- Caminar sin rumbo
- Acumular cosas de manera compulsiva



Agresividad verbal

- Gritar
- Maldecir
- Quejas
- Llamadas constantes de atención
- Actitud negativa
- Arrebatos emocionales
- Ruidos extraños (llanto, risa sin causa aparente)
- Lenguaje ofensivo (insultos, insinuaciones sexuales)
- Preguntas o frases repetitivas



Agresividad física

- Morder
- Golpear
- Patear
- Lastimarse o lastimar a otros
- Comportamientos físicos inapropiados (insinuaciones sexuales, escupir, arañar, dar portazos)
- Destruir cosas
- Lanzar cosas
- Resistirse a la ayuda



Interpretación de actores

Si usted es su **cuidador**, es importante que recuerde que es la condición lo que provoca estos arrebatos, no es culpa suya ni la de su ser querido.



Interpretación de actores

La demencia por Alzheimer ya es una gran carga.

Pero los síntomas de la **agitación que puede ocurrir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer** son una dificultad de otro tipo distinto. Afecta a alrededor de la mitad o más de las personas mayores de 65 años en Estados Unidos con demencia por Alzheimer. Es una de las condiciones conductuales más persistentes y angustiantes que uno pueda tener, lo cual podría complicar los desafíos ya presentes en la demencia por Alzheimer.

Estas son algunas de las cargas adicionales asociadas con esta condición:*



Cambios en la capacidad para realizar actividades cotidianas.



Mayor riesgo de otros problemas médicos.



Mayor riesgo de hospitalización.

Es importante saber que aunque esta condición está relacionada con la demencia por Alzheimer, se diagnostica y se trata por **separado**.

* Comparado con pacientes sin agitación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DESTACADA:

No tome REXULTI si tiene alergia al brexpiprazol o a alguno de los componentes de REXULTI.



Ayuda para seres queridos como el suyo



**EN ESTUDIOS CLÍNICOS,
REXULTI AYUDÓ A QUE
LOS PACIENTES TUVIERAN
UNA REDUCCIÓN
SIGNIFICATIVA EN LA
FRECUENCIA DE LOS
SÍNTOMAS DE LA AGITACIÓN**

REXULTI fue estudiado en dos ensayos clínicos de 12 semanas de duración en pacientes de 55 a 90 años de edad con agitación que puede ocurrir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer. Al término de las 12 semanas, los pacientes que tomaron REXULTI presentaron una mejora mayor de los síntomas de agitación en comparación con los pacientes que tomaron placebo. Los resultados podrían variar en cada persona.

REXULTI fue estudiado en personas que también estaban tomando otros medicamentos, incluidos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Para aquellas personas que están lidiando con esta condición, REXULTI podría ofrecerles menos síntomas de agitación. Hable con el médico de su ser querido para ver si REXULTI es la opción adecuada de tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DESTACADA:

REXULTI podría provocar efectos secundarios graves, incluidos:

- Problemas cerebrovasculares, incluyendo accidentes cerebrovasculares, en personas mayores con psicosis relacionada con demencia, los cuales podría resultar mortales.



Interpretación de actores



Interpretación de actores

Preguntas frecuentes

¿Cómo debería tomarse REXULTI?

REXULTI se toma una vez al día, con o sin comida. Es importante hablar con el farmacéutico o proveedor de atención médica de su ser querido si alguno de los dos tiene preguntas sobre cómo tomar REXULTI.

- Haga que su ser querido tome REXULTI tal como se lo recetó su proveedor de atención médica.
- No cambie la dosis, ni deje que su ser querido deje de tomar REXULTI sin primero hablar con su proveedor de atención médica. Solo el proveedor de atención médica puede cambiar la dosis si es necesario.
- **Su ser querido no debería tomar REXULTI si tiene alergia al brexpiprazol o a alguno de los componentes de REXULTI.**
- Si toma una cantidad de REXULTI mayor de la recetada, llame de inmediato al proveedor de atención médica o al Centro de Control de Intoxicaciones al 1-800-222-1222 o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano.

REXULTI no debe usarse como tratamiento “según sea necesario” para la agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DESTACADA:

REXULTI podría provocar efectos secundarios graves, incluidos:

(continuación)

- **El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es una afección grave que puede resultar mortal.** Llame a su proveedor de atención médica o acuda de inmediato a la sala de emergencia del hospital más cercano si tiene alguno o todos los siguientes signos y síntomas de SNM: fiebre alta, cambios en el pulso, presión arterial, ritmo cardíaco y respiración; rigidez muscular; confusión, aumento de la sudoración.



Preguntas frecuentes (continuación)

¿Se puede tomar REXULTI con otros medicamentos?

Informe al proveedor de atención médica de su ser querido de todos los medicamentos que su ser querido toma o ha tomado recientemente, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

REXULTI podría interactuar con otros medicamentos, provocando posibles efectos secundarios graves. REXULTI podría afectar la forma en que otros medicamentos actúan y otros medicamentos podrían afectar la forma en que REXULTI actúa.

El proveedor de atención médica de su ser querido puede decirle si es seguro que su ser querido tome REXULTI con sus otros medicamentos. No comience a tomar ni deje de tomar otros medicamentos durante el tratamiento con REXULTI sin primero consultarlo con su proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DESTACADA:

REXULTI podría provocar efectos secundarios graves, incluidos:
(continuación)

- **Movimientos corporales involuntarios (discinesia tardía).** REXULTI podría causar movimientos que no se pueden controlar en el rostro, la lengua u otras partes del cuerpo. Es posible que la discinesia tardía no desaparezca, incluso si deja de tomar REXULTI. La discinesia tardía también podría aparecer después de dejar de tomar REXULTI.



Interpretación de actores



Preguntas frecuentes (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios de REXULTI?

En los estudios clínicos* al menos 2% o más de las personas tratadas con REXULTI reportaron los siguientes efectos secundarios más que las personas tratadas con placebo (pastilla de azúcar):

	TODAS las dosis de REXULTI (1,† 2, and 3 mg) (503 personas)	Placebo (pastilla de azúcar) (251 personas)
Síntomas de resfriado común.	3%	2%
Infecciones de las vías urinarias.	3%	1%
Mareos.	3%	2%
Dolor de cabeza.	8%	8%
Somnolencia.	3%	1%
Insomnio.	4%	3%

*REXULTI fue estudiado en dos ensayos clínicos de 12 semanas de duración en pacientes de 51 a 90 años de edad con agitación que se puede producir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer. Al término de las 12 semanas, los pacientes que tomaron REXULTI presentaron una mejora mayor de los síntomas de agitación en comparación con los pacientes que tomaron placebo.

†No se recomienda la dosis de 1 mg de REXULTI una vez al día para el tratamiento de la agitación que se puede producir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

Los **efectos secundarios más frecuentes** de REXULTI incluyen aumento de peso, somnolencia, mareos, síntomas del resfriado común y desasosiego o sensación de que necesita moverse (acatisia).

Tome nota de cualquier efecto secundario que presente su ser querido mientras toma REXULTI y repórtelo al proveedor de atención médica, en particular si se trata de efectos secundarios nuevos, que empeoran o que le preocupan.

Lea la [INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD](#) en las páginas 14-15.



Interpretación de actores

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DESTACADA:

REXULTI podría provocar efectos secundarios graves, incluidos:

(continuación)

- **Problemas con el metabolismo como, por ejemplo:**

- **Nivel alto de azúcar en sangre (hiperglucemia) y diabetes.** Algunas personas que toman REXULTI podrían presentar aumentos en el nivel de azúcar en sangre. Un nivel muy alto de azúcar en sangre podría provocar coma o la muerte. Su proveedor de atención médica debería medir su nivel de azúcar en sangre antes de comenzar, o poco tiempo después de comenzar a tomar REXULTI y luego periódicamente durante los períodos prolongados de tratamiento con REXULTI.



Preguntas frecuentes (continuación)

¿REXULTI podría afectar al nivel de azúcar en sangre de mi ser querido?

Algunas personas que toman REXULTI pueden presentar un aumento del nivel de azúcar en sangre (hiperglucemia). Un nivel muy alto de azúcar en sangre podría provocar coma o la muerte. El proveedor de atención médica de su ser querido debería medir su nivel de azúcar en sangre antes de comenzar el tratamiento o poco tiempo después de empezar a tomar REXULTI y luego periódicamente durante los períodos prolongados de tratamiento con REXULTI.

Llame al proveedor de atención médica de su ser querido si tiene alguno de estos síntomas de nivel alto de azúcar en sangre mientras toma REXULTI: siente mucha sed; siente mucha hambre; siente malestar en el estómago; necesita orinar con más frecuencia de la habitual; siente debilidad o cansancio; siente confusión o su aliento huele a frutas.

¿REXULTI afectará al nivel de colesterol de mi ser querido?

Los niveles de lípidos (colesterol y triglicéridos) en la sangre de su ser querido podría aumentar mientras toma REXULTI. Antes de comenzar el tratamiento con REXULTI, hable con el proveedor de atención médica si su ser querido tiene niveles elevados de colesterol, triglicéridos o colesterol LDL o niveles bajos de colesterol HDL.

El proveedor de atención médica de su ser querido debería determinar el nivel de lípidos en sangre antes de comenzar el tratamiento o poco tiempo después de empezar a tomar REXULTI y luego periódicamente durante el tratamiento con REXULTI.

En los ensayos clínicos para la agitación que se puede producir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer,* los cambios en los niveles de colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL fueron similares en los pacientes tratados con REXULTI y en los pacientes tratados con placebo.

Lea la [INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD](#) en las páginas 14-15.

¿REXULTI podría hacer que mi ser querido sienta somnolencia o letargo?

REXULTI podría hacer que su ser querido se sienta somnoliento. No deje que su ser querido maneje vehículos, opere maquinaria ni haga otras actividades peligrosas hasta que no sepa cómo le afecta REXULTI a su ser querido.

En los ensayos clínicos para la agitación que se puede producir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer,* el 3% de los pacientes tratados con REXULTI reportaron somnolencia en comparación con el 1% de los pacientes tratados con placebo.

*Dos ensayos clínicos de 12 semanas de duración. Para obtener más información sobre los ensayos clínicos, vea la [página 5](#).

Si tiene más preguntas acerca de REXULTI, visite [REXULTI.com/aad/frequently-asked-questions](https://www.rexulti.com/aad/frequently-asked-questions).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DESTACADA:

REXULTI podría provocar efectos secundarios graves, incluidos:
(continuación)

- **Problemas con el metabolismo como, por ejemplo:**
 - **Nivel alto de azúcar en sangre (hiperglucemia) y diabetes.** (continuación)
- Llame a su proveedor de atención médica si tiene cualquiera de estos síntomas de nivel alto de azúcar en sangre durante el tratamiento con REXULTI:**
- Siente mucha sed.
 - Siente mucha hambre.
 - Siente malestar en el estómago.
 - Necesita orinar con más frecuencia de la habitual.
 - Siente debilidad o cansancio.
 - Siente confusión o su aliento huele a fruta.

Cómo hablar con el médico de su ser querido

El proceso de cada persona es distinto. Sin importar en qué etapa esté su ser querido, estos son algunos consejos para hablar con su médico sobre la **agitación que se puede producir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer**:



Ser claro y específico.

Dígale “Me hace la misma pregunta cinco veces en una hora. Lo hace varias veces a la semana”, en lugar de “Parece preocupada y repite mucho la misma pregunta”. Aunque la diferencia sea pequeña, es fundamental para ayudar al equipo de tratamiento a entender el estado de la condición.



Reconocer las señales del lenguaje corporal.

Ser consciente del lenguaje corporal de su ser querido es fundamental y le permitirá advertir alteraciones en su estado de ánimo y confort causadas por la **agitación que se puede producir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer**.



Mantener una lista actualizada de lo que advierte.

Trate de llevar una lista de los síntomas que observa en su ser querido, con independencia de que sean frecuentes o no. Anote cosas como la hora del día en que ocurre un síntoma o si notó que hubo algo en particular que lo desencadenó. Estos detalles pueden ser útiles para que el médico entienda mejor sus síntomas o situación.



Interpretación de actores

Como cuidador, ayudarse a usted mismo es otra forma de ayudar a su ser querido.

Puede ser bastante difícil como cuidador. Podría atravesar una gran variedad de emociones y desafíos a diario, lo cual es comprensible.

Por esa razón puede ser útil reflexionar sobre cómo se siente usted. Encontrar un equilibrio saludable entre cuidar a alguien que quiere y cuidarse usted puede beneficiar su bienestar.



Contacte a un equipo de apoyo local.

Hay grupos de apoyo patrocinados a nivel local y nacional, tanto presenciales como por Internet. También puede hablar con un terapeuta especializado en apoyo para cuidadores.



Forme un equipo de cuidado y utilícelo.

Reclute a familiares y amigos para ampliar su red de apoyo. Cuando necesite una mano o simplemente un descanso, vea si uno de ellos puede ocuparse y solicite ayuda específica, así saben exactamente cómo ayudar.



Hágase tiempo para usted.

Socializar puede marcar una gran diferencia para encontrar el equilibrio. Quizás sea salir a caminar por el parque o ir de compras con un amigo. Actividades o salidas periódicas sencillas pueden ayudar a restablecer y mantener su propio bienestar.



Hay muchas organizaciones disponibles para ayudar.

Estas son algunas que podrían apoyar a las personas que tienen Alzheimer y a sus cuidadores.



Alzheimer's Foundation of America (AFA)

es una organización nacional que brinda apoyo, servicios y educación a las personas con Alzheimer y demencias relacionadas. Los servicios incluyen una línea directa (866-232-8484) atendida por trabajadores sociales autorizados. www.alzfdn.org



UsAgainstAlzheimer's

trabaja para promover la detección temprana, el diagnóstico y la intervención, y para impulsar los cambios que más importan a cuidadores y enfermos de Alzheimer. www.usagainstalzheimer.org



Alzheimer's Association

es una organización mundial fundada sobre los principios de inclusividad e igualdad. Su compromiso es brindar educación, recursos, defensoría y apoyo a las personas con demencia por Alzheimer y otras demencias relacionadas. www.alz.org



Caregiver Action Network

lucha por ayudar a que los cuidadores entiendan mejor los distintos síntomas que pueden acompañar a la demencia y trabaja para mejorar su calidad de vida. www.caregiveraction.org

Las organizaciones y los recursos indicados no están afiliados ni bajo el control o la influencia de Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (OAPI) y Lundbeck. OAPI y Lundbeck podrían haber patrocinado algunas de estas organizaciones para apoyar su importante trabajo. OAPI y Lundbeck ofrecen información sobre estas organizaciones y recursos solamente para su comodidad. Ni OAPI ni Lundbeck asumen ninguna responsabilidad por el uso de esta información, ni por ninguna información obtenida o proporcionada por estas organizaciones y recursos. OAPI y Lundbeck no son responsables de las consecuencias del uso que usted haga de la información proporcionada por estas organizaciones y recursos.

Asistencia financiera de terceros

Algunas fundaciones independientes de terceros podrían ofrecer asistencia a los pacientes elegibles para los gastos de atención médica como medicamentos recetados, viajes y alojamiento, u otros gastos como vivienda y comida.*

Vea estas fundaciones.

*Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (Otsuka) y Lundbeck LLC (Lundbeck) no están afiliadas ni proporcionan apoyo financiero a ninguna de las fundaciones independientes de terceros mencionadas. Cada fundación independiente de terceros determina sus propios criterios de elegibilidad. Otsuka y Lundbeck no determinan ni tienen influencia sobre la elegibilidad y no pueden garantizar que las fundaciones ofrezcan asistencia. Otsuka y Lundbeck pagaron para tener derecho a usar este enlace. Esta información se proporciona como un recurso educativo para usted y no requiere que use ningún producto de Otsuka o Lundbeck. Otsuka y Lundbeck no revisan la información en este sitio web para ver si es exacta o exhaustiva y no se pronuncian sobre la exactitud de la información ni avalan ni recomiendan una fundación en particular. Esta información proporcionada en el sitio web no es exhaustiva y también podría haber apoyo de otras fuentes y organizaciones.

Cómo cubrir el costo de REXULTI® (brexpiprazol)

¿Quiere saber cuánto le podrían costar los medicamentos recetados de su ser querido? Aquí tiene algunos datos útiles.



Medicare

Con Medicare, los costos de bolsillo para las recetas de REXULTI son en promedio de unos \$21.37 mensuales.* Claro que los costos de bolsillo varían durante el año dependiendo de la fase de la Parte D en la que esté su ser querido.

Los costos de su ser querido podrían ser menos si califica para el programa Extra Help (Ayuda extra) de la Administración del Seguro Social. Visite www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp para obtener más información y ver si su ser querido califica para este programa.

¿Tiene preguntas sobre la Parte D de Medicare? Visite NavigatingPartD.com.



Medicaid

Con Medicaid, el costo de REXULTI es en promedio de unos \$2.88 mensuales.* Usted podría tener que pagar más o menos dependiendo del formulario del estado donde reside.

Para averiguar si su ser querido califica para Medicaid o para obtener más información sobre copagos en el estado donde reside, visite www.medicaid.gov/state-overviews/index.html.

Es una buena idea tener previsto los costos anuales estimados de los medicamentos y saber cuánto tendrá que pagar por los medicamentos de su ser querido durante todo el año.



¿Tiene un seguro comercial? Podría comenzar pagando tan solo \$0.

Si su ser querido tiene seguro comercial y le recetaron REXULTI® (brexpiprazol), podría calificar para la Tarjeta de ahorros de REXULTI.†

Envíe un mensaje de texto al **96747** con la palabra **SAVE** para obtener ya mismo la Tarjeta de ahorros de REXULTI.‡

*Basado en el promedio de precios pagados por los pacientes de enero a diciembre de 2022.

†Oferta no válida para pacientes que pagan en efectivo NI si el seguro primario no cubre el medicamento. Aplican otros términos y condiciones. Aplica un máximo anual de beneficios en función del precio de lista vigente. Vea todos los términos y condiciones en www.rexulti.com/savings-card-terms-conditions para ver el máximo anual de beneficios vigente y más información.

‡Podrían aplicar tarifas de datos y mensajes de texto. La frecuencia de los mensajes varía. Envíe un mensaje de texto con la palabra HELP para recibir ayuda o con la palabra STOP para dejar de recibir mensajes. Otsuka podría usar la información de farmacia para enviar recordatorios de resurtido del medicamento con su consentimiento.

Términos de servicio: www.rexulti.com/savings-card-terms-conditions. Política de privacidad: <https://www.otsuka-us.com/privacy-policy>.

INDICACIÓN e INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DE REXULTI® (brexpiprazol)

INDICACIÓN:

REXULTI es un medicamento recetado que se usa para tratar la agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

REXULTI no debe usarse como tratamiento “según sea necesario” para la agitación asociada con demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Mayor riesgo de muerte en personas mayores con psicosis relacionada con demencia. Los medicamentos como REXULTI pueden aumentar el riesgo de muerte en personas mayores que han perdido el contacto con la realidad (psicosis) debido a la confusión o a la pérdida de memoria (demencia). REXULTI no está aprobado para el tratamiento de personas con psicosis relacionada con demencia sin agitación que podría ocurrir con la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer.

No tome REXULTI si tiene alergia al brexpiprazol o a alguno de los componentes de REXULTI.

REXULTI podría provocar efectos secundarios graves, incluidos:

- Problemas cerebrovasculares, incluyendo accidentes cerebrovasculares, en personas mayores con psicosis relacionada con demencia, los cuales podría resultar mortales.
- El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es una afección grave que puede resultar mortal.

Llame a su proveedor de atención médica o acuda de inmediato a la sala de emergencia del hospital más cercano si tiene alguno o todos los siguientes signos y síntomas de SNM: fiebre alta, cambios en el pulso, presión arterial, ritmo cardíaco y respiración; rigidez muscular; confusión, aumento de la sudoración.

- **Movimientos corporales involuntarios (discinesia tardía).** REXULTI podría causar movimientos que no se pueden controlar en el rostro, la lengua u otras partes del cuerpo. Es posible que la discinesia tardía no desaparezca, incluso si deja de tomar REXULTI. La discinesia tardía también podría aparecer después de dejar de tomar REXULTI.
- **Problemas con el metabolismo como, por ejemplo:**
 - **Nivel alto de azúcar en sangre (hiperglucemia) y diabetes.** Algunas personas que toman REXULTI podrían presentar aumentos en el nivel de azúcar en sangre. Un nivel muy alto de azúcar en sangre podría provocar coma o la muerte. Su proveedor de atención médica debería medir su nivel de azúcar en sangre antes de comenzar, o poco tiempo después de comenzar a tomar REXULTI y luego periódicamente durante los períodos prolongados de tratamiento con REXULTI.

Llame a su proveedor de atención médica si tiene cualquiera de estos síntomas de nivel alto de azúcar en sangre durante el tratamiento con REXULTI:

- Siente mucha sed.
- Siente mucha hambre.
- Siente malestar en el estómago.
- Necesita orinar con más frecuencia de la habitual.
- Siente debilidad o cansancio.
- Siente confusión o su aliento huele a fruta.
- **Niveles elevados de lípidos (colesterol y triglicéridos) en la sangre.** Su proveedor de atención médica debería determinar sus niveles de lípidos en sangre antes de comenzar o poco tiempo después de comenzar a tomar REXULTI y luego periódicamente durante el tratamiento con REXULTI.
- **Aumento de peso.** Usted y su proveedor de atención médica deberían revisar su peso corporal antes de iniciar el tratamiento y a menudo durante el tratamiento con REXULTI.
- **Impulsos inusuales e incontrolables (compulsivos).** Algunas personas que toman REXULTI tienen fuertes impulsos inusuales, de apostar y apuestas compulsivas que no se pueden controlar (ludopatía). Otros impulsos compulsivos incluyen impulsos sexuales, de comprar, comer o darse atracones de comida. Si usted o los miembros de su familia notan que tiene impulsos fuertes o comportamientos nuevos o inusuales, hable con su proveedor de atención médica.
- **Recuento bajo de glóbulos blancos en la sangre.** Su proveedor de atención médica podría ordenarle análisis de sangre en los primeros meses de su tratamiento con REXULTI.

(continúa en la página siguiente)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DE REXULTI® (brexpiprazol) (continuación)

REXULTI podría provocar efectos secundarios graves, incluidos: (continuación)

- **Disminución de la presión arterial (hipotensión ortostática) y desmayos.** Es posible que sienta mareos, aturdimiento o se desmaye cuando se levante muy rápido después de estar sentado o recostado.
- **Caídas.** REXULTI podría hacerle sentir somnoliento o mareado, provocar una bajada de la presión arterial cuando cambia de posición (hipotensión ortostática) y puede enlentecer su pensamiento y motricidad, lo cual podría provocar caídas que pueden causar fracturas u otras lesiones.
- **Convulsiones.**
- **Problemas para controlar la temperatura del cuerpo por lo que siente demasiado calor.** Evite el exceso de calor o deshidratarse durante el tratamiento con REXULTI. No haga demasiado ejercicio. Si hace mucho calor, no salga y quédese en un lugar fresco de ser posible. No se exponga al sol. No use demasiada ropa o ropa pesada. Beba abundante agua.
- **Dificultad para tragar** que puede provocar la entrada de alimentos o líquidos en los pulmones.
- **Somnolencia, letargo, sensación de cansancio, dificultad para pensar y hacer las actividades normales.** No maneje vehículos, opere maquinaria ni haga otras actividades peligrosas hasta que no sepa cómo le afecta REXULTI. REXULTI podría hacerle sentir aletargado.

Antes de tomar REXULTI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tiene o tuvo problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.

- Tiene o tuvo la presión arterial alta o baja.
- Tiene o tuvo diabetes o niveles altos de azúcar en sangre o antecedentes familiares de diabetes o presión arterial alta.
- Tiene o tuvo niveles elevados de colesterol total, colesterol LDL o triglicéridos o niveles bajos de colesterol HDL.
- Tiene o tuvo convulsiones.
- Tiene o tuvo problemas de riñón o hígado.
- Tiene o tuvo un recuento bajo de glóbulos blancos en sangre.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. REXULTI podría dañar al bebé en gestación. Tomar REXULTI durante el tercer trimestre del embarazo podría provocar que el bebé tenga movimientos musculares anormales o síntomas de abstinencia después de nacer. Hable con su proveedor de atención médica sobre el riesgo para el bebé en gestación si toma REXULTI durante el embarazo.
 - Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada o sospecha estar embarazada durante el tratamiento con REXULTI.
 - Hay un registro de exposición de embarazadas para mujeres expuestas a REXULTI durante el embarazo. Si queda embarazada durante el tratamiento con REXULTI® (brexpiprazol), hable con su proveedor de atención médica sobre cómo registrarse en el Registro Nacional de Embarazos para Medicamentos Psiquiátricos. Para registrarse puede llamar al 1-866-961-2388 o visitar <http://womensmentalhealth.org/clinical-and-research-programs/pregnancyregistry/>.

- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si REXULTI pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con REXULTI.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. REXULTI podría interactuar con otros medicamentos y posiblemente provocar efectos secundarios graves. REXULTI podría afectar la forma en que otros medicamentos actúan y otros medicamentos podrían afectar la forma en que REXULTI actúa. Su proveedor de atención médica puede decirle si es seguro tomar REXULTI con sus otros medicamentos. No comience a tomar ni deje de tomar otros medicamentos durante el tratamiento con REXULTI sin antes consultarlo con su proveedor de atención médica.

Los efectos secundarios más frecuentes de REXULTI incluyen aumento de peso, somnolencia, mareos, síntomas del resfriado común y desasosiego o sensación de que necesita moverse (acatisia).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de REXULTI. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico.

Se recomienda reportar los efectos secundarios de REXULTI (brexpiprazol). Llame a Otsuka America Pharmaceutical, Inc. al 1-800-438-9927 o a la FDA al 1-800-FDA-1088 (www.fda.gov/medwatch).





Los momentos importan

Hable con el médico de su ser querido sobre REXULTI.

Lea **TODA LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN**,
incluidos los **RECUADROS DE ADVERTENCIA**, y la **GUÍA DEL MEDICAMENTO**.



© 2025 Otsuka America Pharmaceutical, Inc. Todos los derechos reservados.
Septiembre 2025 11US25EBC0237